



ESAMI RICHIESTI PER LE INDAGINI CONTRASTOGRAFICHE (Urografia – TC con mezzo di contrasto - RM con mezzo di contrasto)

Per sottoporsi ad esami con **Mezzo di Contrasto (M.d.C.)** sia **TAC** che **RM** è indispensabile eseguire il seguente prelievo ematico per la valutazione preliminare del rischio di nefrotossicità relato all'utilizzo di mezzo di contrasto: **CREATININEMIA** (per essere validi devono essere eseguiti entro 30 giorni antecedenti la data dell'esame).

Nota per il paziente e medico curante:

- L'uso di MdC è sconsigliato nei pazienti con manifesto stato di ipertiroidismo e/o con grave insufficienza renale (filtrato glomerulare < 30 ml/minuto)
- Per i pazienti con un valore di creatininemia plasmatica persistentemente superiore a 1,5 mg/dL si richiede una consulenza nefrologica per la somministrazione del M.d.C.

Il giorno dell'esame il paziente dovrà:

1. Osservare un **digiuno assoluto** nelle 4 – 5 ore che precedono l'esame.
- è consentita l'assunzione di liquidi in quantitativi moderati (acqua, the o camomilla).
2. Portare in visione eventuali esami precedenti attinenti la patologia per la quale viene fatto l'esame. (*Ecografie, Risonanza Magnetica, TAC, Radiografie, cartella clinica, etc.*).
3. In caso di "TAC Addome completo" portare una bottiglia da 1,5 Lt di acqua (non gassata, non effervescente). N.B. sarà il personale medico a dire al paziente quando cominciare a bere.
4. In caso di **qualsiasi forma di allergia** informare il medico ed effettuare la seguente **premedicazione**:
 - 13 ore prima l'esame assume una compressa di **Deltacortene** da 25 mg;
 - 7 ore prima l'esame assume una compressa di **Deltacortene** da 25 mg;
 - 1 ora prima l'esame assume una compressa di **Deltacortene** da 25 mg;
 - 30 minuti prima l'esame verrà somministrata **Trimeton intramuscolo** da 10 mg.

Per l'esame di RISONANZA MAGNETICA è importante sapere che:

Non possono sottoporsi a **risonanza magnetica** tutte quelle **persone a cui sono stati impiantati**, pace-maker, elettrostimolatori o persone portatrici di anemia falciforme.

I pazienti portatori di **protesi metalliche fisse** (es. d'anca, o ginocchio), chiodi, viti, placche o fili applicate in ortopedia, clips, spirale endouterina, **devono portare con sé la certificazione di compatibilità RM** ed informare il medico radiologo.

In caso di problemi di **CLAUSTROFOBIA** (provocato dal fatto di rimanere chiusi in un grande cilindro per una certa quantità di tempo) informare il personale medico prima dell'accettazione.

In caso di **Risonanza per lo studio del retto (defeco-RM)** è necessario osservare una buona pulizia del retto mediante microclisma monodose (un clistere la sera prima dell'esame, ed uno la mattina prima dell'esame).

Da evitare il giorno dell'esame: truccarsi, mettere smalto per le unghie, lacca o gel per capelli, lenti a contatto.

N.B. *Gli esami verranno eseguiti con la massima sollecitudine tenendo presente, che per ragioni organizzative (precedenza agli ammalati ricoverati, urgenze ecc.), si potranno verificare ritardi.*

Per informazioni contattare i numeri

091/7022147 (TAC) - 091/7022127 (RM) 0917022114/115 (Uff. CUP)